

Atpažinkite

TB



Atpažinę TB būdingus požymius, nedelsdami kreipkitės į savo šeimos gydytoją.

TB!

Užsikrėtęs ar sergu?

Užsikrėtęs, bet nesergantis tuberkulioze (TB) asmuo:

- nėra ligai būdingų požymių;
- neužkrečia TB bakterijomis kitų asmenų;
- dažniausiai būna teigiamas tuberkulino mėginio testas;
- normali krūtinės ląstos rentgeno nuotrauka ir skreplių tyrimai.

Dalis užsikrėtusių asmenų (5-10 proc.) gali susirgti TB.

Didelę riziką susirgti tuberkulioze turi: užsikrėtusieji ŽIV, sergantys cukralige, neseniai turėję kontaktą su TB sergančiuoju, vaikai iki 5 metų.

Riziką didina:

narkomanija, alkoholizmas, kortikosteroidų ir imunosupresantų vartojimas, vėžys, sunkios inkstų ir žarnyno ligos, nevisavertė mityba, badavimas, mažas kūno svoris.

Asmuo sergantis atvira plaučių tuberkulioze:

- ligai būdingi požymiai:
 - sunkus kosulys, kuris trunka 3 ir daugiau savaičių;
 - kraujo ar skreplių atkosėjimas;
 - silpnumas ar nuovargis;
 - svorio kritimas;
 - apetito stoka;
 - drebulys;
 - karščiavimas;
 - naktinis prakaitavimas.
- gali užkrėsti TB bakterijomis kitus asmenis;
- dažniausiai būna teigiamas tuberkulino mėginio testas;
- gali būti pakitimų krūtinės ląstos rentgeno nuotraukoje, teigiamas skreplių tepinėlis ar pasėlis.

